

ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA

COM-IMA-OD-07 V1 2026-08-04

Presentar la orden médica vigente, la autorización del servicio activa (según los requerimientos de su entidad promotora de salud), el documento de identidad original y la totalidad de los reportes y resultados de sus ecografías previas.

ECOGRAFÍA DOPPLER OBSTÉTRICA EVALUACIÓN DE LA CIRCULACIÓN PLACENTARIA Y FETAL

PUNTUALIDAD: Asistir con una (1) hora de anticipación a la hora programada de su cita para realizar los trámites del ingreso administrativo y validación de derechos sin contratiempos.

Las pacientes menores de 18 años, personas con limitaciones en la movilidad o con condiciones de déficit neurológico, deben asistir obligatoriamente en compañía de un adulto responsable o tutor legal.

Se recomienda no aplicar cremas, aceites, geles o lociones antiestrías en la zona abdominal durante las 24 horas previas al examen. Estos productos crean una barrera física que bloquea las ondas del ultrasonido, degradando drásticamente la calidad y nitidez de la imagen diagnóstica.

Ventana de Tiempo Ideal

Periodo de realización: Se puede realizar en cualquier momento después de la semana 20 de gestación.

Indicación médica: Es mucho más frecuente durante el tercer trimestre para vigilar el crecimiento del bebé o realizar un seguimiento estricto si la madre presenta la presión arterial alta (sospecha o diagnóstico de Preeclampsia).

Instrucciones de Preparación

Alimentación: La paciente debe haber desayunado o almorzado de forma normal antes de la cita. El estado nutricional de la madre influye directamente en los flujos sanguíneos fetales; un ayuno prolongado podría alterar negativamente los resultados del estudio.

Reposo previo obligatorio: Se solicita que la paciente llegue con suficiente anticipación para permanecer sentada y en reposo absoluto durante 15 minutos antes de ingresar al consultorio. Esto garantiza que su frecuencia cardíaca y su presión arterial estén estables, ya que el esfuerzo físico o la agitación del traslado justo antes de la ecografía pueden alterar las medidas de las arterias uterinas.

Vejiga: No se requiere vejiga llena. Un estado de llenado normal y cómodo es suficiente.

Medicamentos habituales: NO debes suspender tus medicamentos para la tensión (en caso de tomarlos). Sin embargo, es obligatorio informar al especialista la dosis exacta y la hora en la que se los tomó el día del examen.