SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA · INFANCIA · SUBRED SUR

Defectos congénitos, mortalidad perinatal y mortalidad en menores de 5 años

Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz · Primer semestre, enero-junio de 2025 y 2026



1. Defectos congénitos

¿Qué son? Alteraciones estructurales o funcionales presentes desde el nacimiento, que pueden detectarse durante la gestación, al nacer o posteriormente.


Prevalencia
2025 2026
441,3 → 420,2
por 10.000 nacidos vivos
▼ 4,8 %
(216 → 211 casos)

5 de cada 10



casos fueron niños (53,1 %); 46,4 % fueron niñas y 0,5 % presentó sexo indeterminado.

Prevalencia de los cinco defectos congénitos más frecuentes, Subred Sur, enero-junio de 2025 y 2026



Nota: Prevalencia por 10.000 nacidos vivos.
Deformidad congénita de la cadera incluye «no especificada» y «otras deformidades de la cadera».

Casos de defectos congénitos según edad de la madre, Subred Sur, enero-junio de 2026




26 → 38
casos en hijos de madres de 35 años o más: un aumento de 46,2 %.

Más de 4 de cada 10
casos de 2026 correspondieron a población residente en estrato 1 (92; 43,6 %). En 2025 fueron 94 (43,5 %).

70 → 71
casos en el régimen subsidiado (33,6 % en 2026). Sin aseguramiento: 3 → 5.

Distribución porcentual de los casos según defecto congénito, Subred Sur, enero-junio de 2026




45,0 %
Los tres defectos más frecuentes son del corazón y suman 95 de 211 casos.

61,3 → 81,6
El defecto del tabique ventricular es el más frecuente.

28,6 → 61,7
por 10.000 nacidos vivos: la prevalencia de conducto arterioso permeable se duplicó.

Casos de defectos congénitos por UPZ y prevalencia por localidad de residencia, Subred Sur, enero-junio de 2025 y 2026



Localidad	Casos 2025	Casos 2026	Prev. 2025	Prev. 2026
Ciudad Bolívar	126	117	438,6	404,8
Tunjuelito	26	26	428,3	410,1
Usme	64	66	452,3	440,9
Sumapaz	0	2	n. c.	n. c.
Subred Sur	216	211	441,3	420,2

Ciudad Bolívar
Prevalencia de 438,6 → 404,8 por 10.000 nacidos vivos. Concentró el 55,5 % de los casos de 2026 (117).

Tunjuelito
Prevalencia de 428,3 → 410,1 por 10.000 nacidos vivos. Venecia presentó una leve disminución (18 → 17 casos).

Usme
Presentó la **mayor prevalencia de la Subred** en 2026: 452,3 → 440,9 por 10.000 nacidos vivos.

Sumapaz
0 → 2 casos. No se calcula la prevalencia debido al reducido número de nacidos vivos

Cuatro UPZ (Ismael Perdomo, Lucero, Arborizadora y Gran Yomasa) concentraron el 50,2 % de los casos de 2026; Usme presentó la mayor prevalencia de la Subred (440,9 por 10.000 nacidos vivos).

Fuente: SIVIGILA, evento 215; RUAF-ND, Secretaría Distrital de Salud. Enero-junio 2025-2026 (datos preliminares).

2. Mortalidad perinatal y neonatal tardía (MPNT)

¿Qué es? Muerte fetal desde las 22 semanas de gestación o con peso fetal de 500 g o más, y muerte neonatal hasta los 28 días de vida.


Razón de MPNT
2025 2026
13,1 → 15,1
por 1.000 nacidos vivos
▲ 15,7 %

6 de cada 10



En 2026, 49 de las 76 muertes (64,5 %) correspondieron a niños y 26 (34,2 %) a niñas; 1 caso tuvo sexo indeterminado. En 2025 se registraron 30 niños, 32 niñas y 2 casos con sexo indeterminado

Muertes perinatales y neonatales tardías según edad gestacional, Subred Sur, enero-junio de 2025 y 2026



Muertes perinatales y neonatales tardías según edad de la madre, Subred Sur, enero-junio de 2026



5 → 10
Muertes en hijos de madres adolescentes (10 a 19 años). Se duplicaron.

Casi la mitad
En 2026, cerca de 5 de cada 10 muertes correspondieron a recién nacidos con peso inferior a 1.000 g (37 de 76).

7 → 14
Muertes en hijos de madres venezolanas. Se duplicaron.


Distribución porcentual de las muertes perinatales y neonatales tardías según edad gestacional, Subred Sur, enero-junio de 2026

84,2 %
Las tres categorías señaladas con línea punteada corresponden a prematuridad (<37 semanas) y concentraron 64 de las 76 muertes de 2026.

7 → 18
Muertes de bebés nacidos entre las 28 y 31 semanas: más del doble que en 2025.

1 → 7
Casos sin aseguramiento en salud. Estrato 1: 44 de 76 casos (57,9 %).

Muertes perinatales y neonatales tardías por UPZ de residencia y razón de MPNT por localidad de residencia, Subred Sur, enero-junio de 2025 y 2026



Localidad	Muertes 2025	Muertes 2026	Razón 2025	Razón 2026
Ciudad Bolívar	32	50	11,1	17,3
Tunjuelito	9	7	14,8	11,0
Usme	23	18	16,3	12,0
Sumapaz	0	1	n. c.	n. c.
Subred Sur	64	76	13,1	15,3

Ciudad Bolívar
17,3 por 1.000 nacidos vivos en 2026
50 muertes; aumentó frente a 2025 (11,1). Lucero y Jerusalem fueron las UPZ con más registros.

Tunjuelito
11,0 por 1.000 nacidos vivos en 2026
7 muertes; disminuyó frente a 2025 (14,8). Venecia disminuyó de 8 a 2 y la UPZ Tunjuelito aumentó de 1 a 5.

Usme
12,0 por 1.000 nacidos vivos en 2026
18 muertes; disminuyó frente a 2025 (16,3). Gran Yomasa presentó la mayor reducción, de 11 a 2.

Sumapaz:
Registró 1 muerte en 2026; en 2025 no registró muertes.

15,1 por 1.000 nacidos vivos en 2026, 76 muertes en la Subred Sur; aumentó frente a 2025 (13,1), principalmente en Ciudad Bolívar.

Fuente: SIVIGILA, evento mortalidad perinatal y neonatal tardía; nacidos vivos: RUAF-ND, Secretaría Distrital de Salud. Enero-junio 2025-2026 (datos preliminares). Razón por 1.000 nacidos vivos.

3. Mortalidad en menores de 5 años

Tasa de mortalidad
2025 2026
9,0 → 10,8
por 1.000 nacidos vivos
▲ 19,6 %

6 de cada 10




6 de cada 10 muertes registradas en 2026 ocurrieron en niños (34 de 54).

Muertes en menores de 5 años según causa, Subred Sur, enero-junio de 2025 y 2026



Muertes en menores de 5 años según grupo de edad, Subred Sur, enero-junio de 2026




Casi 8 de cada 10
bebés fallecidos antes del año murieron en el primer mes de vida (38 de 50)

14 → 12
muertes entre 1 y 11 meses, el único grupo de edad que disminuyó.

8 de cada 10
bebés fallecidos antes del año nacieron prematuros, antes de las 37 semanas (41 de 50 con dato registrado).

Distribución porcentual de las muertes según causa, Subred Sur, enero-junio de 2026




74,1 %
Las cuatro causas señaladas con línea punteada se originan en el periodo perinatal y concentraron 40 de las 54 muertes registradas en 2026.

2 → 9
muertes por gestación corta y bajo peso al nacer entre 2025 y 2026.

1 → 3
muertes por tumores; dos de ellas por leucemia, todas en niñas y niños de 1 a 4 años.

Muertes en menores de 5 años por UPZ y tasa de mortalidad por localidad de residencia, Subred Sur, enero-junio de 2025 y 2026



Localidad	Muertes 2025	Muertes 2026	Tasa 2025	Tasa 2026
Ciudad Bolívar	20	38	7,0	13,1
Tunjuelito	6	4	9,9	6,3
Usme	18	12	12,7	8,0
Sumapaz	0	0	n. c.	n. c.
Subred Sur	44	54	9,0	10,8

Ciudad Bolívar
13,1 por 1.000 nacidos vivos en 2026. 38 muertes; aumentó frente a 2025 (7,0). Concentró el 70,4 % de las muertes.

Tunjuelito
6,3 por 1.000 nacidos vivos en 2026. 4 muertes; disminuyó frente a 2025 (9,9).

Usme
8,0 por 1.000 nacidos vivos en 2026. 12 muertes; disminuyó frente a 2025 (12,7).

Sumapaz
no registró muertes en ninguno de los dos periodos.

10,8 por 1.000 nacidos vivos en 2026, 54 muertes en la Subred Sur; aumentó frente a 2025 (9,0), principalmente en Ciudad Bolívar.

Fuente: SIVIGILA, estadísticas vitales, Secretaría Distrital de Salud. Enero-junio de 2025 y 2026 (datos preliminares). Tasa por 1.000 nacidos vivos, según localidad de residencia.

Elaborado por: Martha Jiseth Tovar – Epidemióloga
René Vaca - Geógrafo
Componente Geográfico en Vigilancia en Salud Pública Subred Sur